

GARANZIA PHYSIOPLANT (VALIDA A PARTIRE DAL 1° MARZO 2019)

1. *La presente garanzia (definita di seguito "LIFE TIME WARRANTY") della Physioplant S.r.l. (Physioplant) si applica ai prodotti elencati qui di seguito e in favore solo del medico/dentista curante (operatore)
La presente garanzia non prevede alcun diritto nei confronti di terzi, in particolare pazienti o fornitori intermedi.
La garanzia Physioplant copre la sostituzione di prodotti della Physioplant "Safe-lock".
La garanzia Physioplant copre solo la sostituzione di prodotti Physioplant e non di eventuali costi associati, tra cui, a puro titolo esemplificativo, eventuali trattamenti associati*
2. *La Garanzia Physioplant copre tutti i prodotti di vendita e utilizzo odontoiatrico, quali impianti, Abutment, viti protesiche e componenti del sistema "Safe-lock" utilizzate all'interno del cavo orale.
Physioplant garantisce la sostituzione integrale dell'impianto in caso di mancata integrazione e del moncone (abutment dell'impianto Cono) se connesso a impianto fallito; l'ottenimento della sostituzione è condizionato dalla restituzione del prodotto accompagnato dall'apposito questionario debitamente compilato Allegato 1(Questionario di garanzia).
Physioplant si riserva di accettare il reso dopo aver verificato la congruità della richiesta e la validità della garanzia
Dopo le suddette verifiche verrà inviato il prodotto direttamente al richiedente entro 30 gg dal ricevimento del modulo.*
3. *Physioplant garantisce la sostituzione di qualsiasi prodotto Physioplant se mal funzionante o per difetto della resistenza o della stabilità del materiale, durante i periodi di garanzia, come esposto nella sezione 2 Physioplant sostituirà il prodotto con lo stesso o con prodotto sostanzialmente equivalente, purché la Garanzia sia attiva al momento del trattamento clinico, e che le condizioni di garanzia vengano rispettate e documentate.*
 - 3.1 *I prodotti Physioplant siano stati usati in maniera esclusiva e non in associazione con qualsiasi altro prodotto di altre aziende.*
 - 3.2 *I prodotti Physioplant siano stati rispediti in condizioni di sterilità (o disinfettati come indicato nelle istruzioni per l'uso)*
 - 3.3 *Compliance e applicazione delle istruzioni di Physioplant (nelle istruzioni per l'uso) valide al momento del trattamento, come pure delle procedure odontoiatriche riconosciute durante e dopo il trattamento.*
 - 3.4 *Seduta igiene e controllo obbligatorio con cadenza trimestrale/quadrimestrale, indicata e documentata nella scheda paziente e nella carta identità implantare*
 - *Utilizzo della componente Safe-lock originale e dedicata al cavo orale*
 - *Utilizzo della vite definitiva originale Safe-lock*
 - 3.5 *La garanzia non copre gli incidenti, i traumi o qualunque altro danno causato dal paziente e da terzi*
 - 3.6 *Compilazione completa e firma del modulo garanzia da recapitare entro tre mesi della comparsa di un caso di garanzia*
 - 3.7 *In casi di prodotti Physioplant realizzati su misura, L'operatore fornirà a Physioplant i dati relativi alla progettazione.*
 - 3.8 *Fa parte integrante della garanzia anche l'Allegato 2 (indicazioni e controindicazioni all'uso degli impianti e corretta realizzazione della protesi)*

4. **Limitazioni**

La presente garanzia Physioplant è l'unica garanzia fornita da Physioplant e si aggiunge ai diritti di garanzia compresi nel contratto di fornitura.

L'operatore rimane libero di far valere i suoi diritti nei confronti del fornitore.

PHYSIOPLANT:

NON CONCEDE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, E DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER PERDITE DI GUADAGNO E PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, COME PURE PER DANNI COLLATERALI E CONSEGUENTI, DIRETTI O INDIRETTI, CORRELATI AI PRODOTTI, AI SERVIZI O ALLE INFORMAZIONI PHYSIOPLANT

5. **Territorialità**

La presente garanzia Physioplant si applica a livello mondiale solo ai prodotti Physioplant commercializzati da un'affiliata Physioplant o da un distributore ufficiale Physioplant.

6. **Modifiche o cessazione della garanzia**

Physioplant può modificare o dichiarare la cessazione della presente garanzia in qualsiasi momento, interamente o in parte.

Eventuali modifiche o la cessazione della garanzia Physioplant non inficeranno la copertura prevista della presente garanzia Physioplant per i prodotti Physioplant installati prima della data delle modifiche e della cessazione.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI ALL'USO DEGLI IMPIANTI E CORRETTA REALIZZAZIONE DELLA PROTESI

Le seguenti indicazioni e controindicazioni sono applicabili in soggetti sani, con l'esclusione di patologie di ogni genere, atteso che dette circostanze interferirebbero comunque con un pre e post operatorio;

Comportamento pre-intervento

- Devono essere eseguiti tutti i passi diagnostici intraorali, strumentali (radiografie di primo e secondo livello), biochimici (accertamenti sierologici) e anamnestici volti ad escludere controindicazioni assolute o relative all'intervento

Comportamento dopo intervento di implantologia

- Deve essere eseguita una rx-endorale di controllo
- Deve essere instaurata una corretta terapia antibiotica e igienica
- Si deve evitare il carico masticatorio per almeno 6/8 settimane
- Devono essere effettuate visite di controllo regolari fino al carico

Dopo carico masticatorio

- Deve essere eseguita una rx-endorale al momento del carico e dopo un anno da esso
- Devono essere eseguite sedute di igiene professionale ogni 3/4 mesi con controllo della stabilità delle strutture
- Devono essere eseguite verifiche occlusali ed eventuali molaggi ogni 12 mesi

Controindicazioni assolute all'implantologia

- osteoporosi di grado elevato, soprattutto se appare molto compromesso per ipomineralizzazione il distretto osseo dei mascellari;
- nefropatie di gravità tale da avere riflessi negativi sull'emocoagulazione e sul trofismo osseo;
- diabete non controllato per possibili problemi di guarigione dei tessuti e sovrainfezioni dei siti chirurgici;
- cardiopatie ischemiche con fenomeni di angina non ancora controllati efficacemente da una terapia stabilizzata;
- gravi patologie dell'apparato respiratorio con compromissione della capacità ventilatoria;
- esiti di interventi di terapia radiante impongono un periodo di attesa di almeno un anno dall'interruzione dell'irradiazione;
- psicosi che compromettono il "rapporto medico-paziente"
- tumori ossei benigni o maligni nel sito implantare
- Inoltre; è controindicato il posizionamento di impianti in siti ossei che non presentino adeguati diametri trasversali e verticali senza previa o contestuale ricostruzione ossea.

Controindicazioni generali

- Terapia anticoagulante, che va interrotta 3 giorni prima e 3 giorni dopo l'intervento
- Utilizzo di bifosfonati o di denosumab in corso
- Tutto quanto indicato nel capitolo precedente se di grado medio/lieve
- Stile di vita insalubre: abuso di alcool, fumo, droghe, zuccheri
- Igiene non corretta e atteggiamento negativo per il miglioramento di essa

Indicazioni alla realizzazione della protesi

La protesi deve essere realizzata secondo le indicazioni e i protocolli prescritti dalla casa, possibilmente da un laboratorio certificato o sotto il controllo di esso. La protesi deve presentare una perfetta connessione con l'impianto, priva di micromovimenti e di incongruenze di interfaccia, precontatti o svincoli laterali e in protrusione, non in linea con la corretta occlusione del paziente